

vaccifar

Bute

200mg/g



**Fenylbutazon 200mg/g granulaat
paarden**

Bute

200mg/g



INDICATIES

Paarden:

- Bute wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van kreupelheid en aandoeningen van het bewegingsapparaat, zowel acuut als chronisch. Denk hierbij aan onder andere artritis, peri-artritis, tendinitis, tendovaginitis, neuritis, myositis, hoefbevangenheid en hoefkatrolontsteking.
- Daarnaast is het geschikt voor de behandeling van letsels aan zachte weefsels zoals bursitis, mastitis, hematomen, kneuzingen en verwondingen na de geboorte. Ook inzetbaar na operaties en bij lokaal uier-oedeem postpartum.

DOSERING EN TOEDIENINGSWIJZE

Orale toediening.

Paarden:

- Volwassen paarden (500 kg): Voor de behandeling van acute ontstoken verwondingen van het bewegingsapparaat en na operaties is de dosering twee 10 gram zakjes per dag (gelijk aan 8 mg/kg aan werkzame stof) gedurende vijf dagen, gevolgd door een zakje per dag.
- Voor de behandeling van chronisch ontstoken verwondingen van het bewegingsapparaat is de dosering een 10 gram zakje per dag (gelijk aan 4 mg/kg aan werkzame stof) gedurende 10-20 dagen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de dierenarts.
- Veulens dienen de helft van de aanbevolen doses toegediend te krijgen.

Bute

Fenylbutazon 200mg/g granulaat

WACHTTERMIJNEN

- Niet voor gebruik in paarden die bedoeld zijn voor humane consumptie.
- Behandelde paarden mogen nooit meer worden geslacht voor humane consumptie.
- Het paard moet worden verklaard als 'niet bestemd voor humane consumptie' onder nationale paardenpaspoortwetgeving.

FIRMA/MAH

Vaccifar

VERPAKKING

Kartonnen doos met 100 zakjes van 5 gram

CNK CODE

3874534

REGISTRATIENR

BE-V533075

OP DIERGENEESKUNDIG VOORSCHRIFT

vaccifar

www.vaccifar.com

info@vaccifar.com