Vaccifar

Selectan®

300 mg/ml

Selectan® 300 mg/ml oplossing voor injectie

runderen - varkens

Selectan®

300 mg/ml

INDICATIES

Aandoeningen veroorzaakt door voor florfenicolgevoelige bacteriën.

Runderen:

- Therapeutische behandeling van infecties van de luchtwegen bij runderen veroorzaakt door Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida en Histophilus somni.

Varkens :

- Behandeling van acute uitbraken van respiratoire aandoeningen veroorzaakt door stammen van Actinobacillus pleuropneumoniae en Pasteurella multocida.

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken bij volwassen fokstieren of bij beren die bestemd zijn voor de fok.
- Niet gebruiken bij runderen die melk voor menselijke consumptie produceren.
- Niet gebruiken bij dieren met bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor een van de hulpstoffen.

DOSERING EN TOEDIENINGSWEG

Runderen:

20 mg/kg lichaamsgewicht (1 ml SELECTAN® per 15 kg) tweemaal intramusculair toedienen met een tussenperiode van 48 uur. Het volume dat per injectieplaats toegediend wordt, mag niet meer bedragen dan 10 ml.

Varkens:

15 mg/kg lichaamsgewicht (1 ml SELECTAN® per 20 kg) tweemaal intramusculair toedienen in de nekspieren met een tussenperiode van 48 uur. Het volume dat per injectieplaats toegediend wordt, mag niet meer bedragen dan 3 ml.

BIJWERKINGEN

Runderen:

Tijdens de behandeling kan een verminderde voedselopname voorkomen en kunnen de faeces tijdelijk weker zijn. De behandelde dieren herstellen echter snel en volledig na stopzetting van de behandeling.
Toediening van het diergeneesmiddel kan ontstekingswonden veroorzaken op de injectieplaats die 14 dagen aanhouden.

Varkens:

De bijwerkingen die vaak optraden waren voorbijgaande diarree en/of perianaal en rectaal erytheem/oedeem die bij 50% van de dieren kunnen voorkomen.
Deze bijwerkingen kunnen een week lang waargenomen worden. Een tijdelijke zwelling kan waargenomen worden rond de injectieplaats gedurende 5 dagen.
Ontstekingswonden op de injectieplaats kunnen vastgesteld worden tot 28 dagen.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling

Florfenicol 300 mg/ml.

WACHTTERMIJNEN

- **Runderen:** (Orgaan)vlees: 30 dagen. Niet gebruiken bij melkkoeien die melk voor menselijke consumptie produceren.
- **Varkens:** (Orgaan)vlees: 18 dagen.

FIRMA/MAH

Via parallelimport

VERPAKKINGSGROOTTE

Fles van 250 ml

OP DIERGENEESKUNDIG VOORSCHRIFT

Vaccifar