vaccifar

Uniferon

200 mg/ml

200 mg Ijzer Dextraan / Oplossing voor injectie

Varkens

Uniferon

200 mg/ml

INDICATIES

Varkens:

- Preventie en behandeling van ferriprive anemie bij jonge biggen (tussen 2 en 5 dagen oud).

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken bij dieren met vitamine E-deficiëntie en/of selenium deficiëntie en spierdystrofie.
- Niet gebruiken bij dieren die infectieuze anemie vertonen.

DOSERING EN TOEDIENINGSWEG

Toedieningswijze:
Parenterale toediening, bij voorkeur intramusculair (I.M.), eventueel subcutaan (S.C.). Behandeling starten tussen de 2de en de 5de dag na de geboorte. Injectieplaats ontsmetten voor de inspuiting.

Toedieningsplaats:
Bij voorkeur in de nekstreek achter het oor.

Dosering :
1 ml I.M. of S.C.

BIJWERKINGEN

Een accidentele drievoudige dosering geeft geen klinische nevenreacties. Symptomen van ijzerintoxicatie (anafylactoïde reacties met duizeligheid, dyspnee, cyanosis, shock, collaps, eventueel sterfte) kunnen optreden bij frequente toediening of accidentele injectie direct in de bloedbaan, alsook bij vitamine E en/of selenium tekort.

WACHTTIJDEN

Vlees en slachtafval: 0 dagen.

Samenstelling

Elke ml bevat:

Werkzaam bestanddeel:
200 mg de fer-dextran
gelijkwaardig: Fe+++ hydroxide
dextraan 560 mg

Hulpstof(fen):
Natrium Chloride
Phenol
Water voor injectie

FIRMA/MAH

Via parallel-import

VERPAKKING

Bidon van 12 x 200 ml

OP DIERGENEESKUNDIG VOORSCHRIFT

Vaccifar